



NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS/HERSTELLERS

WH Pharmawerk Weinböhla GmbH,
Poststraße 58, 01689 Weinböhla
Bundesrepublik Deutschland

Mitvertrieb: Dechra Veterinary Products
Deutschland GmbH
Hauptstraße 6–8, 88326 Aulendorf
Bundesrepublik Deutschland

Dysticum®

90 g/100 g Huminsäuren, Natriumsalze, 5 g/100 g Huminsäuren, 5 g/100 g Almasilat
Pulver zum Eingeben über das Futter für Rinder, Pferde, Hunde, Katzen, Kaninchen, Goldhamster, Meerschweinchen, Ziervögel, Zootiere (Zoowierdkäuer, Primaten, Beuteltiere, Schwielensohler, Elefanten, Equiden, Landraubtiere).

WIRKSTOFFE

100 g Dysticum® enthalten:
Huminsäuren, Natriumsalze 90,0 g
Huminsäuren 5,0 g
Almasilat 5,0 g

ANWENDUNGSGEBIETE

Zur Therapie und Metaphylaxe von Magen- und Darmerkrankungen wie

- Infektiöse (durch Bakterien oder Viren verursachte) Durchfälle oder unspezifische Durchfälle (z. B. ernährungsbedingt)
- Verdauungsstörungen aufgrund von Fäulnis- und Gärungsprozessen (Dyspepsie) sowie Stoffwechselstörungen (besonders den Kohlenhydratstoffwechsel betreffend), die durch Umstellung, Futterwechsel, Fehlfütterung oder verminderte Futteraufnahme bedingt sind
- Entfernung bestimmter, mit dem Futter aufgenommenen schädlicher Verbindungen (z. B. Pilzgifte, Pestizid- bzw. Schwermetallbelastungen) sowie erst im Magen-Darm-Bereich gebildeter Schadstoffe oder deren Umwandlungsprodukte
- Normalisierung der bakteriellen Magen-Darm-Flora
- Zur schnellen Regulation der natürlichen Stoffwechselvorgänge im Verdauungstrakt, z. B. bei intensiv gefütterten Hochleistungstieren (auch bei Nitratbelastung über das Futter und Trinkwasser).

GEGENANZEIGEN

Keine bekannt.

NEBENWIRKUNGEN

Keine bekannt.

Falls Sie Nebenwirkungen, insbesondere solche, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, bei Ihrem Tier feststellen, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

ZIELTIERARTEN

Rinder, Pferde, Hunde, Katzen, Kaninchen, Goldhamster, Meerschweinchen, Ziervögel, Zootiere (Zoowierdkäuer, Primaten, Beuteltiere, Schwielensohler, Elefanten, Equiden, Landraubtiere)

DOSIERUNG FÜR JEDE TIERART, ART UND DAUER DER ANWENDUNG

Schwarzbraunes Pulver zum Eingeben über das Futter.

Bei Inappetenz kann Zwangsupplikation per Flasche, Irrigator oder Sonde nach Einmischen in etwas Wasser erfolgen.

Bei allen Tierarten bei schweren und fortgeschrittenen Erkrankungen:

Infektiöse	täglich 1 g Dysticum®/kg
Enteritisformen	Körpergewicht (KGW) über 3 Tage, danach Reduzierung auf Normbehandlung

Dyspepsie mit der Gefahr der Resorption von Toxinen aus dem Magen-Darm-Trakt	täglich zweimal 0,5 g Dysticum®/kg KGW über 3–5 Tage, danach Reduzierung auf die Normbehandlung
--	---

akute Intoxikationen durch orale Giftaufnahme (Schwermetalle, Arzneimittel, Pestizide)	am 1. und 2. Tag jeweils bis zu 2 g Dysticum®/kg KGW mehrmals verteilt eingeben, danach Reduzierung auf die Normbehandlung
--	--

Normbehandlung

Therapie:

Rinder, Kälber, Pferde, Fohlen, Zootiere:
0,3 g Dysticum®/kg KGW

Hunde, Katzen:
0,5 g Dysticum®/kg KGW

Kaninchen, Goldhamster, Meerschweinchen:
1 g Dysticum®/kg KGW

Ziervögel:

1 g Dysticum® in 10 ml Wasser einmischen und tropfenweise mehrmals täglich eingeben.



Es empfiehlt sich, die Tagesdosis auf 2 Fütterungen aufzuteilen.

Bis zum Abklingen der Symptome genügt in der Regel eine 3-tägige Behandlung. In schweren Fällen und zur Vermeidung einer wiederholten Erkrankung wird eine 5-tägige bzw. eine dem Krankheitsverlauf entsprechend längere Anwendung empfohlen.

Zur Prophylaxe bei anfälligen Tieren insbesondere Jungtieren bei Futterumstellung bzw. Umstallung ist die halbe therapeutische Dosis ausreichend.

Es ist darauf zu achten, dass die vorgesehene Dosis jeweils restlos aufgenommen wird. Dazu ist das Pulver vor jeder Applikation in einen Teil des Futters frisch einzumischen und vor der eigentlichen Fütterung zu verabreichen.

Bei Tieren mit schweren Durchfallerkrankungen sollten zusätzliche therapeutische Maßnahmen (u. a. Elektrolytersatz) ergriffen werden.

Ein Tierarzt sollte zu Rate gezogen werden.

HINWEISE FÜR DIE RICHTIGE ANWENDUNG

Keine Angaben

WARTEZEIT

Rind, Pferd:	essbare Gewebe:	0 Tage
	Milch:	0 Tage
Kaninchen:	essbare Gewebe:	0 Tage

BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Das Arzneimittel nach Ablauf des auf dem Behältnis angegebenen Verfalldatums nicht mehr anwenden.

BESONDERE WARNHINWEISE

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und andere Wechselwirkungen:

Die Verabreichung beim Kalb sollte grundsätzlich erst ab dem 2. bis 3. Lebenstag beginnen.

Bei Verabreichung in Verbindung mit oral wirksamen Chemotherapeutika kann innerhalb von 2 h eine resorptionsmindernde Wirkung eintreten.

Dysticum® kann auch während Trächtigkeit und Laktation angewendet werden.

BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEM ARZNEIMITTEL ODER VON ABFALLMATERIALIEN

Nicht aufgebrauchte Tierarzneimittel sind vorzugsweise bei Schadstoffsammelstellen abzugeben. Bei gemeinsamer Entsorgung mit dem Hausmüll ist sicherzustellen, dass kein missbräuchlicher Zugriff auf diese Abfälle erfolgen kann. Tierarzneimittel dürfen nicht mit dem Abwasser bzw. über die Kanalisation entsorgt werden.

GENEHMIGUNGSDATUM DER PACKUNGSBEILAGE

August 2018

WEITERE ANGABEN Apothekenpflichtig

Falls weitere Informationen über das Arzneimittel gewünscht werden, setzen Sie sich bitte mit dem örtlichen Vertreter des Zulassungsinhabers in Verbindung.

Packungsgrößen:

20 x 5 g, 10 x 50 g, 150 g, 1 kg, 3 kg

02-19

Hinweis zur Dosierung:

1 gestr. Teelöffel ca. 2 g, 1 gehäufte Teelöffel ca. 5 g, 1 gestr. Esslöffel ca. 5 g, 1 gehäufte Esslöffel ca. 15 g